

## 化學治療

藥名(學名/商品名)	給藥途徑	副作用	注意事項
Cisplatin (順鉑)	靜脈注射	噁心嘔吐、手腳麻刺的周邊神經病變、耳鳴、影響腎臟功能、血球低下	1. 禁忌:對含鉑的合成物有嚴重過敏反應者、懷孕及哺乳婦女禁止使用。 2. 注意腎臟功能變化及水分補充 3. 注意腎臟功能及聽力影響
Carboplatin (卡鉑)	靜脈注射	噁心嘔吐、手腳麻刺的周邊神經病變、食慾影響、血球減少、掉髮、皮膚發疹	1. 禁忌:對含鉑的合成物有嚴重過敏反應者及懷孕及哺乳婦女禁止使用。 2. 應攝取足夠水份以防腎臟受損
Pemetrexed, alimta (愛寧達)	靜脈注射	血球減少、厭食、噁心、肝功能指數異常, 疲倦、神經病變、輕微掉髮	於治療前7 天開始須補充葉酸及維他命B12, 且葉酸須補充至最後一劑藥物給予後21天止
Gemcitabine, Gemzer (健擇)	靜脈注射	噁心嘔吐、血球減少、掉髮、皮膚紅疹、呼吸困難、水腫、發燒	1. 對胎兒或嬰兒可能有潛在的危險, 懷孕及授乳期婦女禁用 2. 注意血球低下時之自我保護, 避免感染
Paclitaxel, Taxol (汰癌勝、太平洋紫杉醇)	靜脈注射	骨髓抑制:主要造成白血球數目的減少、噁心嘔吐、肌肉痠痛、末梢神經感覺異常:手腳麻刺、掉髮、水腫	1. 血球低下, 注意自我保護, 預防感染 2. 有時會引起心跳過敏, 低血壓。必要時需要做心電圖監測
Docetaxel, Taxotere (剋癌易、歐洲紫杉醇)	靜脈注射	虛弱、口腔炎、噁心和嘔吐, 以及腹瀉、肌肉疼痛、體液滯留及周邊水腫、掉髮、末梢神經麻刺感	1. 血球低下, 注意自我保護, 預防感染 2. 易有過敏反應, 包括血管性水腫、皮疹、潮紅、發燒、低血壓、支氣管痙攣及呼吸困難, 須於注射前使用一些抗過敏用藥預防。
Fluorouracil 5-FU 好復	靜脈注射	口腔炎和食道炎、腹瀉、食慾減退、噁心、嘔吐	1. 注意肝功能變化 2. 可能造成口腔炎, 注意維持口腔清潔
Etoposide Vepesid (滅必治)	靜脈注射 口服	噁心嘔吐、腹瀉、掉髮、皮疹、肝功能指數升高、末梢神經異常	1. 口服膠囊應和水吞服, 最好為空腹狀態下。室溫保存 2. 可能造成白血球低下, 須注意自我保護, 避免感染
Topotecan Hycamtin 癌康定	靜脈注射	骨髓抑制、噁心嘔吐、掉髮、過敏反應、腹痛、疲倦	1. 可能出現間質性肺炎, 需定期監測肺部功能 2. 白血球減少容易感染, 須注意自我保護
TS-1 愛斯萬	口服	食慾不振、噁心嘔吐、白血球減少	1. 若肝功能異常者, 須小心使用 2. 白血球減少易感染, 須注意自我保護
Vinorelbine, Navelbine (溫諾平)	口服	骨髓抑制、神經末梢感覺異常、疲倦或無力、便秘、噁心或嘔吐、掉髮	1. 宜避光冷藏保存, 整粒吞服, 勿嚼食或咬破。 2. 血球降低易引起感染, 須注意自我保護
Uracil, tegafur, UFT, UFUR (友復)	口服	口炎、嘔吐、腹瀉腹痛、倦怠、厭食、皮膚發疹、心臟、肝臟或腎臟功能受損	1. 注意肝功能變化 2. 注意腹瀉症狀, 及脫水狀況, 需補充液體與適當處置